



POEMS syndrom

(Polyneuropati, organomegali, endokrinopati, M-protein og "skin changes")

Version 2.0

GODKENDT

Faglig godkendelse

15. november 2021 (DMSG)

Administrativ godkendelse

15. november 2021 (Sekretariatet for
Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. december 2023

INDEKSERING:

M-komponent, polyneuropati, POEMS

Indholdsfortegnelse

| | |
|--------------------------------------|----|
| 1. Anbefalinger (Quick guide)..... | 2 |
| Screening | 2 |
| Behandling | 2 |
| Rehabilitering..... | 2 |
| 2. Introduktion | 3 |
| 3. Grundlag | 4 |
| Screening | 4 |
| Behandling | 8 |
| Rehabilitering..... | 13 |
| 4. Referencer..... | 15 |
| 5. Metode | 18 |
| 6. Monitoreringsplan..... | 19 |
| 7. Bilag | 20 |
| Om denne kliniske retningslinje..... | 22 |

1. Anbefalinger (Quick guide)

Screening

1. Der bør udredes for POEMS ved polyneuropati og en af følgende: M-komponent (især lambda-letkæde), thrombocytose, ødem eller papilødem (styrke D)
2. Der bør udredes for POEMS ved CIDP (kronisk, inflammatorisk, demyeliniserende polyneuropati) der ikke responderer på standard behandling (styrke D)
3. Der bør udredes for POEMS ved refraktær ascites, gynækomasti eller organomegali af uafklaret årsag i kombination med polyneuropati (styrke D)

Behandling

4. Strålebehandling 40-50 Gy til lokaliseret sygdom, kurativt intenderet (styrke C)
5. Systemisk cytoreduktiv behandling ved dissemineret sygdom, herunder højdosis behandling med ASCT hos yngre, egnede patienter (styrke C), samt patienter med tegn på progression 3-6 mdr efter afsluttet strålebehandling (styrke D)
6. Der tilrådes forsigtighed med regimer, som kan medføre neurotoxicitet, f.eks. bortezomib- og thalidomid-holdige regimer, men behandling hermed kan ikke opfattes som kontraindiceret (styrke D)

Rehabilitering

7. Supplerende behandling af neuropatiske gener med fysioterapi, ergoterapi, gangredskaber eller kørestol, samt neuropatiske smerter i hht vanlige standarder (styrke D)
8. Ved dominans af neuropati gener anbefales konference med neurologer mhp evt neurorehabilitering. Der foreligger ingen POEMS specifik evidens (Styrke D)
9. Supplerende behandling af endokrinologiske problemer i hht vanlige standarder (styrke D)
10. Behandlinger af ødemer/ ekstravaskulære symptomer med diuretika og evt UL-vejledt centese i hht vanlig standard (styrke D)

2. Introduktion

POEMS syndrom (**P**olyneuropati, **O**rganomegali, **E**ndokrinopati, **M**onoklonal protein, **S**kin (=hud) forandringer) er en monoklonal plasmacelle sygdom.

POEMS syndrom er en sjælden, men formentlig også overset plasmacelle dyskrasi. Idet overlevelsen generelt er god og sygdommen kan forventes effektivt behandlet med strålebehandling eller moderne myelomatoselignende behandling er det vigtigt at være opmærksom på diagnosen og sikre tidlig behandling for at undgå svære neurologiske skader.

Incidensen i Danmark er mindre end 1/100.000.

Debiterer oftest i 50-70 års alderen. Medianoverlevelsen ligger i kohortestudier mellem 33 måneder ved monoterapi med steroid (1) og 13,8 år ved moderne behandling (2). 10 års overlevelse på 63%, med forbedring i fht historiske data (3).

Formål

Det overordnede formål med retningslinjen er at understøtte en evidensbaseret kræftindsats af høj og ensartet kvalitet på tværs af Danmark.

Det konkrete formål er at understøtte relevant udredning og behandling af patienter med POEMS syndrom.

Patientgruppe

Patienter mistænkt for og diagnosticeret med POEMS syndrom, mhp at sikre relevant diagnostik og behandling.

Målgruppe for brug af retningslinjen

Denne retningslinje skal primært understøtte det kliniske arbejde og udviklingen af den kliniske kvalitet, hvorfor den primære målgruppe er klinisk arbejdende sundhedsprofessionelle i det danske sundhedsvæsen.

3. Grundlag

Screening

1. Der bør udredes for POEMS ved polyneuropati og en af følgende: M-komponent (især lambda-letkæde (91%)), thrombocytose, ødem eller papilødem (styrke D)
2. Der bør udredes for POEMS ved erhvervet demyeliniserende neuropati, med mistanke om CIDP (kronisk, inflammatorisk, demyeliniserende polyneuropati) senest ved manglende respons på standard behandling (styrke C, D)
3. Der bør udredes for POEMS ved refraktær ascites, gynækomasti eller organomegali af uafklaret årsag (styrke D)

Litteratur- og evidensgennemgang

Der foreligger en relevant retningslinje for diagnostik og behandling af POEMs syndrom fra DMSG fra 2019. Der foreligger en opdateret vejledning på UpToDate fra juli 2020 (4). Der foreligger ingen systematisk litteratur omkring systematisk screening for POEMS. Der foreligger et enkelt mindre case-serie studie (5), vedrørende screening af polyneuropati-patienter med S-VEGF for POEMS (styrke D). Et britisk retrospektivt kohortestudie fra et tertiært referral center på 100 patienter har påvist forsinket diagnose med 15 måneder fra symptomdebut (6). I den samme kohorte ser der ud til at være en sundhedsøkonomisk gevinst ved tidl VEGF måling ved CIDP mistanke (7). På denne baggrund anbefales nu måling af VEGF hos patienter med smertende distal CIDP fænotype hvor der er påvist IgA eller IgGlambda på mistanke om POEMS (8). Anbefalinger stammer fra ekspertudsagn, ud fra en mindre case serie (9), og opdateret ekspertanbefaling fra 2021 (10).

Diagnostik af POEMS baseres på IMWG kriterier (11) baseret på Mayo-kriterierne (2).

Diagnostiske kriterier

De diagnostiske kriterier er sammensatte og inkluderer to mandatoriske kriterier, tre major- og seks minor-kriterier (hyppighed af symptomer fra (6)):

Mandatoriske major kriterier (begge kræves):

1. Polyneuropati som typisk er aggressivt progredierende (35% er i kørestol eller sengeliggende ved diagnosetidspunkt) uden eller kun delvist responderende på standard behandling med fx IVIG, længdeafhængig (93%) dvs. predominant i underekstremiteterne, smertefuld (75%) og distal demyeliniserende på ENG).
2. Monoklonal plasmacelle sygdom (>90% lambda). S- eller urin-M-komponent (ofte i lav koncentration) eller monoklonal plasmacelleinfiltration i knoglemarven (ofte <10%).

Major kriterier (plus mindst én af følgende kræves):

1. Osteosklerotiske knogleforandringer ca 50% (oftest forandringer i pelvis, columna, costa eller proximalt i ekstremiteterne), mixed ca 30%, lytiske ca 10%.
2. Castleman's sygdom (karakteristisk morfologisk fund i forstørret lymfeknude) 14-73%

3. Forhøjet Vascular Endothelial Growth Factor (plasma VEGF > 200 ng/L (se nedenfor),

Minor kriterier (plus mindst én af følgende kræves):

1. Organomegali (milt, lever, lymfeknuder) 50-86%
2. Ødemer, pleuraeffusion eller ascites 29-87%
3. Endokrinologiske abnormiteter: binyrebarken, thyroidea, gynækologisk, parathyroidea, pancreas, hypofysen (diabetes og hypothyroidose er ikke tilstrækkelig som eneste manifestation)
4. Hudforandringer (fx hyperpigmentering, hypertrichosis, acrocyanosis, plethora, hæmangiomer, teleangiektasier, clubbing af fingre, sclerodermi) 68-90%
5. Papilødem (29-64%)
6. Trombocytose (34-88%)/polycytæmi 9-18%

Herudover ses ofte følgende symptomer:

1. Øget proteinindhold i cerebrospinalvæsken (>90%)
2. Vægttab 41%
3. Træthed
4. Nyreinsufficiens
5. Pulmonal hypertension (36%), nedsat DLCO (>15%)
6. Arterielle/venøse tromber (oftest cerebral infarkt, myokardie infarkt eller Budd-Chiari syndrom).

Udredning**Neurologisk:**

Vurdering af neurolog samt ENG (påvist sensomotorisk længdeafhængig demyeliniserende polyneuropati)

Hæmatologisk

Ved mistanke om POEMS bør patienten udredes med:

Anamnestisk: Fokus på B-symptomer og evt endokrine forstyrrelser herunder menstruationsforstyrrelser og sexuel dysfunktion.

Objektivt: Lymfadenopati, gynækomasti, pleuraeksudat, organomegali, neurologisk undersøgelse inkl arefleksi, gangforstyrrelser (herunder positiv Romberg), hudforandringer

Basale parakliniske undersøgelser, herunder blod- og urinundersøgelser:

M-komponent i serum og urin, serum frie lette kappa/lambda kæder (FLC). International standard er døgnopsamling til analyse for M-komponent i urin; alternativt anbefales undersøgelse af morgen spoturin. **Der er ofte tale om M-komponent i lav koncentration, hvorfor det er afgørende at der gennemføres immunfiksation, ved klinisk mistanke og negativt M-komponent på immunelektroforese.**

Hæmoglobin, ery-MCV, reticulocytal, leukocytal, leukocyttype, trombocytal, calcium ion, urat, carbamid, kreatinin, natrium, kalium, IgA, IgG, IgM, U-protein. Der anbefales udregnet estimeret kreatinin clearance (eGFR) og døgnurin kreatinin clearance bestemmelse eller crom-EDTA-clearance bestemmelse anbefales ved forhøjet serum kreatinin.

Albumin, beta-2-mikroglobulin, LDH.

ALAT, basisk fosfatase, bilirubin, faktor II VII X, APTT, CRP, ferritin, cobalamin, folat, haptoglobin, DAT test.

Endokrinologisk screening (ved diagnose, samt nyopståede symptomer):

Thyroidea: TSH

Parathyroidea: PTH og vitamin D

Kønshormoner: LH, FSH og østradiol/androgenstatus
Pancreas: HbA1C
Binyre: (dU-Kortisol.), s-cortisol, ACTH og synacten-test
Hypofyse: Prolaktin og evt IGF-1

Bestemmelse af Vascular Endothelial Growth factor (VEGF) kan være afgørende for at stille diagnosen, idet det er et major kriterium:

Human-VEGF-A analyse i plasma ved POEMS syndrom

Måling af VEGF udføres i Danmark ved Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital AUH:

Kontakt

Lægefagligt ansvarlig: Tina Parkner, mail: tinpar@rm.dk
Laboratoriet: Multi 4, tlf: 30604283

Materiale

Prøven tages i et 3 mL EDTA-glas. Prøven centrifugeres ved (3000G) i 5 min <1 time efter prøvetagning
1 mL plasma afpipetteres og fryses v. -20 til -80 °C.
Prøveglasset påføres: Patient-navn, cpr, dato og prøvenummer

Forsendelse

Prøven sendes på tøris til:

**Blodprøver og Biokemi, Multi 4
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N**

Følgebrev

Inden for Danmark afregnes på lige fod med andre Biokemiske analyser.

Forventet svartid indenfor 3 uger

Pris: 1259,85 kr. (2021-niveau)

Analyse svar

VEGF-A plasma værdier angives som middel af dobbeltbestemmelse

Værdier > 200 ng/L betragtes som forhøjede.

Forventet normal niveau: <100ng/L.

Løbende opdateret info om analysen: Analysefortegnelsen.dk under AUH, så hospitaler og søg VEGF.

Supplerende us:

EKG og Ekkokardiografi (mhp højresidig funktion og pulmonal hypertension)

Evt LFU ved dyspnø, inkl DLCO, specielt ved ASCT overvejelse.

Øjenlægeundersøgelse mhp papilødem (minor kriterie)

Perifer nerveledningshastigheds undersøgelse (ENG)

Evt Dermatologisk vurdering

Evt Lumbalpunktur med flowcytometri for differentialdiagnostik, og spinal protein

Billeddiagnostik:

CT af hals, thorax, abdomen og bækken med kontrast (mhp organomegali, lymfadenopati, effusioner), samt knoglevindue fra kranie til knæ mhp knogleforandringer.

(Konventionel skelet rtg har en falsk negativ rate på 36% i et retrospektivt studie (12))

Den diagnostiske mistanke om POEMS bør specifikt fremhæves overfor radiologen, idet osteosclerotiske forandringer ellers kan overses.

FDG PET/CT kan overvejes, men osteosclerotiske knogleforandring er ofte 18F-FDG-PET-negative (13, 14). 18F-NaF-PET/CT er kasuistisk rapporteret mere sensitivt for osteosclerotiske læsioner (15).

Knoglemarvsundersøgelse, og evt. andre histologiske undersøgelser:

Udstrygninger af marv og perifert blod, marvaspirat, knoglemarvsbiopsi, og evt. imprints af biopsi forsendes til morfologisk undersøgelse, herunder immunhistokemi for klonalitet (intra-cytoplasmatisk let-kæde restriktion), som kan påvise lymfoide aggregater (10).

Flowcytometrisk undersøgelse af knoglemarv er ikke obligat for at stille diagnosen, men tillader mere specifik karakteristisk af den maligne celled immunfænotype.

Evt. UL/CT-vejledt biopsi fra knogleforandring kun ved tvivl om anden årsag til osteosklerosen?

Molekylærdiagnostik.

2 mindre kohortesudier (16, 17) på 20 hhv 42 POEMS patienter har identificeret en genetisk og transkriptionel delvis forskellig signatur fra myelomatose og MGUS plasma celler, men fundene afventer validering mhp brug i klinikken. Cereblon ekspression kan være prognostisk markør for POEMS patienter behandlet med lenalidomid, men er ikke anvendt i klinikken (18).

Patientværdier og – præferencer

Der foreligger et enkelt kvalitativt studie baseret på en patient (19) der understreger værdien af korrekt og tidlig diagnostik, behandling og rehabilitering. Da ubehandlet POEMS potentielt er dødeligt eller invaliderende pga polyneuropati med gode behandlingsmuligheder, er den klinisk erfaring at relevant diagnostik og efterfølgende relevant behandling foretrækkes af patienterne.

Rationale

POEMS syndrom er en sjælden, men formentlig også overset plasmacelle dyskrasi. Idet overlevelsen generelt er god og sygdommen kan forventes effektivt behandlet med strålebehandling eller moderne "myelomatosebehandling" er det vigtigt at være opmærksom på diagnosen og sikre tidlig behandling for at undgå svære, irreversible neurologiske skader. Sundhedsøkonomisk er der ifølge et studie merværdi i tidlig screening med M-komponent og VEGF før iværksættelse af CIDP behandling (7), men dette er ikke klinisk standard i neurologiske afdelinger og heller ikke anbefalet i internationale guidelines.

Bemærkninger og overvejelser

Atypiske præsentationer af POEMS kan ses (uden mandatoriske kriterier opfyldt). Som hovedregel anbefales tæt observation frem til de diagnostiske kriterier er opfyldte. Ved svært invaliderende symptomer (fx refraktær ascites) og atypisk præsentation, kan behandling i hht nedenstående anbefalinger overvejes (20) (styrke D).

Behandling

- 4. Strålebehandling 40-50 Gy til lokaliseret sygdom (≤ 2 (3) foci), kurativt intenderet (styrke C)**
- 5. Systemisk cytoreduktiv behandling ved dissemineret sygdom, herunder højdosis behandling med ASCT hos yngre (fysiologisk <70 år), egnede patienter (styrke C), samt patienter med tegn på progression 3-6 mdr efter afsluttet strålebehandling (styrke D)**
- 6. Der tilrådes forsigtighed med regimer, som kan medføre neurotoxicitet, f.eks. bortezomib- og thalidomid-holdige regimer, men behandling hermed kan ikke opfattes som kontraindiceret (styrke D)**
- 7. Tromboseprofylakse i form af magnyl (eller anden pladehæmmer) og LMWH (low molecular weight heparin) profylakse bør initieres ved diagnose, magnyl kan ophøre ved normalisering af VEGF, og LMWH ved ophør af behandling i remission (styrke D).**

Litteratur- og evidensgennemgang

Der er ingen international, evidensbaseret standard for behandling. Der foreligger ingen randomiserede studier.

Der foreligger en relevant retningslinje for diagnostik og behandling af POEMS syndrom fra DMSG fra 2019. Der foreligger en opdateret vejledning på UpToDate (4). Der er et systematisk Cochrane review fra 2012 (21). Der er et systematisk review angående Lenalidomid behandling og POEMS syndrom fra 2014 (22) og et systematisk review fra 2021 (23), der inkluderer 8 studier, heraf 1 randomiseret (24), og 4 prospektive studier (25-28), samt 3 retrospektive studier (29-31). Ved supplerende søgning i PubMed Medline findes endnu et retrospektivt studie angående mobilisering før ASCT (32).

Der fundet 2 relevante kliniske prospektive forsøg (24, 27) fra PubMed-Medline.

Supplerende primærsøgning og gennemgang af referencelister har bidraget med yderligere referencer i form af kohortestudier, herunder en retrospektiv opgørelse af 347 patienter (33) og case-serier, både prospektive og retrospektive (styrke C).

Strålebehandling

Strålebehandling af lokaliseret sygdom (uden klonale plasmaceller i knoglemarv) baseres på et retrospektivt studie med 99 patienter, hvoraf 64 patienter med solitært knoglelæsion modtog strålebehandling, versus patienter med dissemineret sygdom der modtog systemisk behandling. 2års OS var 90% i strålebehandlingsgruppen vs 78% i den systemisk behandlede gruppe (styrke C) (2). Ved dominans af et enkelt eller 2 knoglelæsioner og minimal knoglemarvsinvolvering kan strålebehandling initieres på trods af mindre knoglemarvsinvolvering og M-komponent og S-VEGF monitoreres efter 6-12 måneder mhp om der er behov for systemisk behandling (10).

Strålebehandling (35-54 Gy) som initial, kurativt intenderet behandling anbefales ved 2 (-3) lokaliserede knoglefoci ud fra CT og uden systemisk involvering bedømt ved knoglemarvsbiopsi (styrke C) (34), baseret på en retrospektiv kohorte af 38 patienter (sv. til 26% af POEMS patienterne i kohorten) som beskrevet i (35). Overvej PET-CT før beslutning om lokal strålebehandling mhp respons (se responseevaluering).

Der kan ses bedring af systemiske symptomer inkl neuropati indenfor 6 mdr til 3 år efter lokaliseret strålebehandling. 4 års PFS er 52%, med 4 års OS på 97%. Systemisk salvage terapi kan initieres efter failure af strålebehandling (35).

En mindre retrospektiv kohorte på 6 patienter med mere avanceret stadie/ mere komorbiditet rapporterer om lignende responsrater, men lavere OS og PFS (36).

Systemisk behandling

Lenalidomid

Poolet analyse af 11 rapporterede kohorter, samt 4 af forfatterens egne patienter, i alt 51 patienter behandlet med lenalidomid (både førstelinje og relaps) indtil progression eller intolerable bivirkninger viser hæmatologisk responsrate på 95% og neurologisk responsrate på 92%, med 2yPFS på 42%, 2y OS på 100% (22). En nyere kinesisk opgørelse med 103 LenDex behandlede (12 cykler) gav 3y PFS på 65% og 3y OS på 83% (33) R/R POEMS behandlet med lavdosis lenalidomid hos 12 patienter har vist neurologisk respons hos 67% og hæmatologisk respons hos 77% i kontinuert behandling, med estimeret 2y OS og PFS på 92% (29).

Lenalidomid behandling indtil progression eller intolerable bivirkninger er beskrevet i et 18 patienter prospektivt open-label studie (13 relaps, 5 nydiagnosticerede), med en ORR på 72%, heraf 56% med neurologisk repons. Efter 3y-OS 100% og 3y-PFS på 59% (27).

Sammenlignelige resultater findes i et fase 2 studie ved førstelinje behandling af både 41 yngre og ældre patienter med POEMS med 12 måneders lavdosis lenalidomid-dexamethason med neurologisk respons rate på 95% og hæmatologisk responsrate på 46%, 3y OS på 90% og PFS på 75% (25). Lignende resultater ses i mindre kohorte på 8 første linje behandlede patienter (37). Generelt rapporteres lenalidomid veltolereret uden neuropati forværring (22).

Lenalidomid anbefales således både som 1. linje hos ældre/unfite patienter, som induktion til ASCT (husk høst) hos yngre, og muligt som vedligeholdelse behandling efter ASCT (38) (Styrke C). Der foreligger flest

studier med behandling indtil progression eller intolerable bivirkninger, men der er også set effekt ved 12 måneders behandling, men lenalidomid kontinuert (vedligehold) anbefales for at opretholde respons ud fra retrospektive data (33).

Ved alle IMiDs gives tromboseprofylakse og de er omfattet af et risikominimeringsprogram mhp at forebygge teratogenicitet.

HDT og ASCT

Højdosis behandling og ASCT anbefales af yngre, egnede patienter på baggrund af case-serier (styrke C) (34, 38). Den kan gennemføres HDT i form af Mel140-200 i hht gængse retningslinjer for myelomatose.

Stamcellemobilisering med G-CSF monoterapi vs cyklofosamid og G-CSF (og tillæg af plerixafor i hht gængse retningslinjer) er omdiskuteret (38), og der kan ikke retrospektivt påvises forskelle i en kohorte på 25 patienter (32). Induktionsbehandling kan formentlig undlades, men kan bruges som symptomkontrollerende behandling frem til transplantation.

Ved gennemgang af 7 kohorter (38) inkluderende 5-127 patienter, induktionsbehandlet med HD Melfalan, maximal alder 69 år, rapporteres i den største kohorte om terapirelateret mortalitet på 3% (39). Engraftment syndrom (feber, udslæt, lungeinfiltrater, diarre) ses hos 22-37% (38), kan behandles med steroid 1-2mg/kg (optil 500mg) udtrappes over 10 dage (40). Klinisk respons efter autolog transplantation ses hos 69-100% af patienterne, neurologisk respons hos alle.

I de tre kohorter på >20 patienter: 23 patienter (41), 59 patienter (42) og 127 patienter (39) ses 3 og 5y OS på hhv 94-96% og 65-94%. 5 års PFS på 60-74%

Supplerende data fra Mayo kohorten med 83 transplanterede patienter rapporteres om 10y OS på 90%, og bedre OS ved ASCT end strålebehandling (3) (styrke C).

Andre behandlinger:

Steroid og melfalan-prednisolon

En historisk kohorte overvejende behandlet med corticosteroid monoterapi havde en lav mean OS på 33md (1). Dette genfindes i et retrospektivt studie hvor corticosteroid monoterapi sammenlignes med melfalan-prednisolon (2y OS 33% vs 100%) (43).

Melfalan dexamethason er undersøgt i et prospektivt, ikke randomiseret studie på 31 patienter, der ikke var kandidater til ASCT (inkl af finansielle årsager). Der var 100% neurologisk respons og 100% OS ved en median FU på 21 mdr. (26). I en nyere retrospektiv opgørelse fandtes 3y PFS på 85% og 3y OS 91% (33). Behandlingen er stamcelletoksisk og skal ikke initieres hvis der planlægges HDT med ASCT (styrke C).

Thalidomid

En kohorte med 9 patienter behandlet med thalidomid og dexamethason gav klinisk bedring eller symptom stabilisering hos alle 9. 2 års OS på 100% og 1 års remission på 56%. Der blev ikke rapporteret om thalidomid induceret neuropati (44).

Et fase 2/3 randomiseret, dobbelt blindet, multicenter studie inkluderende 25 patienter sammenlignede Dexamethason-monoterapi vs ThalidomidDex, efterfulgt af Thalidomid behandling til alle. ThalidomidDex gav bedret QoL, motorisk funktion og S-VEGF niveauer vs Dexa monoterapi, men med bivirkninger i form af sinusbradykardi, og forværring i sensorisk polyneuropati hos 23% efter længere tids behandling (24) (styrke

C). Ved alle IMiDs gives tromboseprofylakse se anbefaling og de er omfattet af et risikominimeringsprogram mhp at forebygge teratogenicitet.

Bortezomib

Rapporteret effekt på overvejende kasuistisk basis. En enkelt case serie med 20 patienter, behandlet med bortezomib (1mg/m² x2/uge iv) i kombination med cyklofosamid, rapporterer 76% hæmatologisk ORR, 95% neurologisk ORR uden neurologisk forværring hos nogle patienter (30). Pga bivirkningsprofil med neuropati, bør brugen vurderes individuelt (40). Bortezomib bør bruges s.c. og x1/uge for at reducere neuropati risikoen (UptoDate) (styrke C-D)

Carfilzomib, Daratumumab, Pomalidomide, og anden nyere behandling

Der er rapporteret kasuistisk effekt i R/R POEMS syndrom hos 1 pt med hhv Daratumumab (45) og Carfilzomib (46) (styrke C). Pomalidomide er ikke beskrevet.

Anti-VEGF

Anbefales ikke uden for kliniske studier. Mindre studier, med blandet outcome, herunder terapirelateret død (40) (styrke C).

Tromboseprofylakse

Et retrospektivt kohortestudie på 83 patienter fra UK fandt 14 patienter med arterielle events, 9 med venøse og 2 med begge dele, hvoraf 16 arterielle og 7 venøse events var før initiering af behandling. På baggrund af dette anbefales initiering af både trombocythæmmer (fx magnyl 75mg) og LMWH profylakse indtil der er sygdomskontrol bedømt på VEGF remission. Såfremt kontinuert IMiD (vedligehold) eller anden efterfølgende trombogen behandling iværksættes anbefales vedvarende LMWH profylakse, indtil ophør og sygdomsremission (47) (styrke C).

Responseevaluering

Responseevaluering er multifacetteret og monitoreres ved både blodprøver og evaluering af involverede organ(er). Der foreligger ikke nogen fastlagt retningslinje, men generelt anbefales både hæmatologisk respons, VEGF respons, evt PET-respons (hvis gjort baseline) og organ respons evalueret (20, 40):

Hæmatologisk respons ud fra modificerede myelomatose kriterier (obs lav M-komponent):

- Complete response (CR_H) – Negativ knoglemarv og negativ immunofixation af serum og serum og urin. Hvis baseline KM var negativ er der ikke behov for ny KM.
- Very good partial response (VGPR_H) – 90 procent reduktion i M-protein eller immunofixation positiv, kun evaluerbar hvis M-protein var mindst 5 g/L ved baseline.
- Partial response (PR_H) – 50 procent reduktion i M-protein eller immunofixation positiv hvis baseline M-protein var mindst 10 g/L.
- No response – opfylder ikke kriterier for PR_H.

Der anbefales månedlig måling under behandling, fuld respons evaluering efter 3-6 mdr. Der bør ses respons indenfor 6 mdr.

VEGF respons

Måling af plasma-VEGF anbefales i hht international guidelines ca hver 3-6. md. Der kan være diskrepans mellem klinisk respons og VEGF målinger og respons kan ikke udelukkende evalueres på plasma-VEGF (Dispenzieri 2017). OBS samme målemetode (plasma/ serum for evaluering).

- Complete response (CR_V) – Normalisering af VEGF
- Partial response (PR_V) – Fald ≥ 50 procent fra baseline, hvis initialt forhøjet
- No response (NR_V) – Ikke CR_V eller PR_V.

Organ respons

Evaluering hver 3-12. md (klinisk skøn) af primært involverede organer mhp sammeligning ved baseline, fx neuropati / EKKO/ LFU/effusion. CTCAE gradering kan evt anvendes mhp forbedring/ forværring. Ved progressionsmistanke reevaluering som ved baseline.

Mhp neuropati kan Overall Neuropathy Limitation Scale (ONLS) score anvendes. Neuropati stabiliserer sig typisk efter 3 mdr, og kan forventes at bedres efter 6 måneder, med maximalt respons efter 2 til 3 år.

18-FDG-PET-respons

- Complete radiologic response (CR_R) – Initialt FDG positive læsion(er) på baseline PET scan forsvundet.
- Partial radiologic response (PR_R) – Initial SUV_{max} reduceret 50 procent
- No radiologic response – Ikke CR_R or PR_R.

Patientværdier og – præferencer

Da de fleste patienter er syge ved præsentation og har symptomer (neuropati som major kriterie), med forventet respons også på neuropatien ved behandling er klinisk erfaring at de fleste foretrækker ovenstående behandling. Der foreligger ikke evidens på området.

Rationale

Der er i anbefalingerne lagt vægt på at anbefale de behandlinger der foreligger bedst evidens for, skønt styrken er lav. Samtidig er valgt behandlinger der er velkendte for hæmatologiske læger i hele landet som led i myelomatosebehandlingen, hvorfor håndtering af behandling og bivirkninger er velkendte for klinikerne.

Bemærkninger og overvejelser

De samme regimer, som er effektive ved myelomatose, forventes også at være effektive ved POEMS, grundet fælles ætiologi i malign plasmacelle sygdom. Der tilrådes forsigtighed med regimer, som kan medføre neurotoxicitet, f.eks. bortezomib- og thalidomid-holdige regimer, men behandling hermed kan ikke opfattes

som kontraindiceret. Der er rapporteret om neuropatiforværring ved langtidsbrug af thalidomid ved POEMS (24), men ikke ved bortezomib.

Rehabilitering

8. **Supplerende behandling af neuropatiske gener med fysioterapi, ergoterapi, gangredskaber eller kørestol, samt neuropatiske smerter i hht vanlige standarder (styrke D)**
9. **Ved dominans af neuropati gener anbefales konference med neurologer mhp evt neurorehabilitering. Der foreligger ingen POEMS specifik evidens (Styrke D)**
10. **Supplerende behandling af endokrinologiske problemer i hht vanlige standarder, obs debut under/efter behandling (styrke C)**
11. **Behandlinger af ødemer/ ekstravaskulære symptomer med diuretika og evt UL-vejledt centese i hht vanlig standard (styrke D)**

Litteratur- og evidensgennemgang

Der foreligger sparsom evidens på området. Anbefalinger stammer fra ekspertanbefaling (20, 40), samt enkelte case-serier.

Anbefaling 8,9 og 11 er baseret på ekspertanbefaling (20, 40) der beskriver håndtering af komplicerende symptomer til POEMS. Desuden enkelt caseserier om specifikke aspekter: Efter succesfuld ASCT ses bedring i neurologiske symptomer hos alle (100%), baseret på en case-serie på 60 patienter. Heraf 45% med behov for kørestol før ASCT, og ingen med behov efter ASCT (48). Der findes et enkelt review angående prævalens af smertefuld neuropati hos POEMS patienter (op til 76%), men ingen data på behandling af denne gruppe patienter specifikt (49) (Styrke C-D).

To case-serie på hhv 59 r (34) og 383 patienter (50) beskriver forløbet af endokrinopatier ved diagnose og under behandling for POEMS. Da endokrinopatier er hyppigere under follow-up 92% end ved diagnose (63%), men nogle patienter remitterer under behandling anbefales kontinuert endokrinologisk opfølgning. Risikoen for polycytæmi ved testoteronsubstitution synes øget (51) (Styrke C).

Patientværdier og – præferencer

Baseret på klinisk erfaring generne fra symptomer foretrækker de fleste patienter ovennævnte strategier for behandling af komplicerende symptomer, mhp at genvinde flest mulig funktioner.

Rationale

Der foreligger sparsom evidens for rehabilitering. Da symptombilledet strækker sig over flere specialer (herunder hæmatologi, neurologi, oftalmologi, dermatologi, endokrinologi), anbefales tæt koordinering med behandlende hæmatolog som nøgleperson, da den hæmatologiske behandling påvirker forløbet af de øvrige symptomer.

Bemærkninger og overvejelser

Da POEMS præsenterer sig med polyneuropati som major kriterie er det vigtigt med et tæt samarbejde og hurtig henvisning mellem neurologisk afdeling og hæmatologisk afdeling for at sikre relevant diagnostik og behandling, samt senere hen relevant rehabilitering ved fortsatte neurologiske symptomer. Behandling og vurdering af POEMS patienter bør ske i samarbejde med endokrinologer

4. Referencer

1. Nakanishi T, Sobue I, Toyokura Y, Nishitani H, Kuroiwa Y, Satoyoshi E, et al. The Crow-Fukase syndrome: a study of 102 cases in Japan. *Neurology*. 1984;34(6):712-20.
2. Dispenzieri A, Kyle RA, Lacy MQ, Rajkumar SV, Therneau TM, Larson DR, et al. POEMS syndrome: definitions and long-term outcome. *Blood*. 2003;101(7):2496-506.
3. Kourelis TV, Buadi FK, Kumar SK, Gertz MA, Lacy MQ, Dingli D, et al. Long-term outcome of patients with POEMS syndrome: An update of the Mayo Clinic experience. *American journal of hematology*. 2016;91(6):585-9.
4. Rajkumar SV. POEMS Syndrome. UpToDate [Internet]. 2020 15OCT 2021.
5. Pihan M, Keddie S, D'Sa S, Church AJ, Yong KL, Reilly MM, et al. Raised VEGF: High sensitivity and specificity in the diagnosis of POEMS syndrome. *Neurology(R) neuroimmunology & neuroinflammation*. 2018;5(5):e486.
6. Keddie S, Foldes D, Caimari F, Baldeweg SE, Bomszyk J, Ziff OJ, et al. Clinical characteristics, risk factors, and outcomes of POEMS syndrome: A longitudinal cohort study. *Neurology*. 2020;95(3):e268-e79.
7. Marsh ES, Keddie S, Terris-Prestholt F, D'Sa S, Lunn MP. Early VEGF testing in inflammatory neuropathy avoids POEMS syndrome misdiagnosis and associated costs. *Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry*. 2021;92(2):172-6.
8. Li Y, Valent J, Soltanzadeh P, Thakore N, Katirji B. Diagnostic challenges in POEMS syndrome presenting with polyneuropathy: A case series. *Journal of the neurological sciences*. 2017;378:170-4.
9. Dispenzieri A. POEMS syndrome: 2021 Update on diagnosis, risk-stratification, and management. *American journal of hematology*. 2021;96(7):872-88.
10. Rajkumar SV, Dimopoulos MA, Palumbo A, Blade J, Merlini G, Mateos MV, et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. *The Lancet Oncology*. 2014;15(12):e538-48.
11. Glazebrook K, Guerra Bonilla FL, Johnson A, Leng S, Dispenzieri A. Computed tomography assessment of bone lesions in patients with POEMS syndrome. *European radiology*. 2015;25(2):497-504.
12. Pan Q, Li J, Li F, Zhou D, Zhu Z. Characterizing POEMS Syndrome with 18F-FDG PET/CT. *Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine*. 2015;56(9):1334-7.
13. Shi XF, Hu SD, Li JM, Luo XF, Long ZB, Zhu Y, et al. Multimodal imaging and clinical characteristics of bone lesions in POEMS syndrome. *International journal of clinical and experimental medicine*. 2015;8(5):7467-76.
14. Marafi FAR, Rasheed R, Usmani S, Alkandari F, Iqbal A. Significance of 18F-sodium Fluoride Positron Emission Tomography in Characterization of POEMS Osteosclerotic Lesions Better Than 18F-fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography. *Indian journal of nuclear medicine : IJNM : the official journal of the Society of Nuclear Medicine, India*. 2018;33(1):76-8.
15. Chen J, Gao XM, Zhao H, Cai H, Zhang L, Cao XX, et al. A highly heterogeneous mutational pattern in POEMS syndrome. *Leukemia*. 2021;35(4):1100-7.
16. Nagao Y, Mimura N, Takeda J, Yoshida K, Shiozawa Y, Oshima M, et al. Genetic and transcriptional landscape of plasma cells in POEMS syndrome. *Leukemia*. 2019;33(7):1723-35.
17. Cai QQ, Gao XM, Le J, Zhao H, Cai H, Cao XX, et al. Cereblon expression is a prognostic marker in newly diagnosed POEMS syndrome treated with lenalidomide plus dexamethasone. *Annals of hematology*. 2021;100(6):1547-52.
18. Twigg J, Methley A, Lavin T, Dickinson G, Teager A. Living with Polyneuropathy Organomegaly Endocrinopathy Monoclonal gammopathy Skin changes (POEMS) syndrome: a case study of healthcare experiences and quality of life. *Disabil Rehabil*. 2021;43(17):2502-10.

19. POEMS syndrome [Internet]. Wolter Kluwer. 2018 [cited 04 OCT 2018]. Available from: https://www-uptodate-com.proxy1-bib.sdu.dk/contents/poems-syndrome?search=poems&source=search_result&selectedTitle=1~22&usage_type=default&display_rank=1.
20. Kuwabara S, Dispenzieri A, Arimura K, Misawa S, Nakaseko C. Treatment for POEMS (polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, M-protein, and skin changes) syndrome. The Cochrane database of systematic reviews. 2012(6):Cd006828.
21. Zagouri F, Kastiritis E, Gavriatopoulou M, Sergentanis TN, Psaltopoulou T, Terpos E, et al. Lenalidomide in patients with POEMS syndrome: a systematic review and pooled analysis. *Leukemia & lymphoma*. 2014;55(9):2018-23.
22. Faizan U, Sana MK, Farooqi MS, Hashmi H. Efficacy and Safety of Regimens Used for the Treatment of POEMS Syndrome- A Systematic Review. *Clinical lymphoma, myeloma & leukemia*. 2021.
23. Misawa S, Sato Y, Katayama K, Nagashima K, Aoyagi R, Sekiguchi Y, et al. Safety and efficacy of thalidomide in patients with POEMS syndrome: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *The Lancet Neurology*. 2016;15(11):1129-37.
24. Li J, Huang XF, Cai QQ, Wang C, Cai H, Zhao H, et al. A prospective phase II study of low dose lenalidomide plus dexamethasone in patients with newly diagnosed polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, monoclonal gammopathy, and skin changes (POEMS) syndrome. *American journal of hematology*. 2018;93(6):803-9.
25. Li J, Zhang W, Jiao L, Duan MH, Guan HZ, Zhu WG, et al. Combination of melphalan and dexamethasone for patients with newly diagnosed POEMS syndrome. *Blood*. 2011;117(24):6445-9.
26. Nozza A, Terenghi F, Gallia F, Adami F, Briani C, Merlini G, et al. Lenalidomide and dexamethasone in patients with POEMS syndrome: results of a prospective, open-label trial. *British journal of haematology*. 2017;179(5):748-55.
27. Suichi T, Misawa S, Nagashima K, Sato Y, Iwai Y, Katayama K, et al. Lenalidomide Treatment for Thalidomide-refractory POEMS Syndrome: A Prospective Single-arm Clinical Trial. *Internal medicine (Tokyo, Japan)*. 2020;59(9):1149-53.
28. Cai QQ, Wang C, Cao XX, Cai H, Zhou DB, Li J. Efficacy and safety of low-dose lenalidomide plus dexamethasone in patients with relapsed or refractory POEMS syndrome. *European journal of haematology*. 2015;95(4):325-30.
29. He H, Fu W, Du J, Jiang H, Hou J. Successful treatment of newly diagnosed POEMS syndrome with reduced-dose bortezomib based regimen. *British journal of haematology*. 2018;181(1):126-8.
30. Royer B, Merlusca L, Abraham J, Musset L, Haroche J, Choquet S, et al. Efficacy of lenalidomide in POEMS syndrome: a retrospective study of 20 patients. *American journal of hematology*. 2013;88(3):207-12.
31. Autore F, Piccirillo N, Nozza A, Innocenti I, Putzulu R, Chiusolo P, et al. Peripheral Blood Hemopoietic Stem Cell Mobilization Regimens in POEMS Syndrome: A Retrospective Study at 2 Hematologic Italian Centers. *Biology of blood and marrow transplantation : journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation*. 2019;25(12):2514-6.
32. Zhao H, Huang XF, Gao XM, Cai H, Zhang L, Feng J, et al. What is the best first-line treatment for POEMS syndrome: autologous transplantation, melphalan and dexamethasone, or lenalidomide and dexamethasone? *Leukemia*. 2019;33(4):1023-9.
33. Dispenzieri A. POEMS syndrome: update on diagnosis, risk-stratification, and management. *American journal of hematology*. 2015;90(10):951-62.
34. Humeniuk MS, Gertz MA, Lacy MQ, Kyle RA, Witzig TE, Kumar SK, et al. Outcomes of patients with POEMS syndrome treated initially with radiation. *Blood*. 2013;122(1):68-73.
35. Suh YG, Kim YS, Suh CO, Kim YR, Cheong JW, Kim JS, et al. The role of radiotherapy in the management of POEMS syndrome. *Radiation oncology (London, England)*. 2014;9:265.

36. Lestang E, Caristan A, Neel A, Graveleau J, Duhamel E, Masseur A, et al. Lenalidomide as frontline therapy in polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, monoclonal protein and skin changes syndrome: a retrospective case series of eight patients. *Leukemia & lymphoma*. 2015;56(6):1895-6.
37. Autore F, Innocenti I, Luigetti M, Piccirillo N, Sora F, Chiusolo P, et al. Autologous peripheral blood stem cell transplantation and the role of lenalidomide in patients affected by poems syndrome. *Hematological oncology*. 2018;36(2):392-8.
38. Cook G, Iacobelli S, van Biezen A, Ziagkos D, LeBlond V, Abraham J, et al. High-dose therapy and autologous stem cell transplantation in patients with POEMS syndrome: a retrospective study of the Plasma Cell Disorder sub-committee of the Chronic Malignancy Working Party of the European Society for Blood & Marrow Transplantation. *Haematologica*. 2017;102(1):160-7.
39. Dispenzieri A. POEMS syndrome: 2017 Update on diagnosis, risk stratification, and management. *American journal of hematology*. 2017;92(8):814-29.
40. Nakaseko C. Autologous stem cell transplantation for POEMS syndrome. *Clinical lymphoma, myeloma & leukemia*. 2014;14(1):21-3.
41. D'Souza A, Lacy M, Gertz M, Kumar S, Buadi F, Hayman S, et al. Long-term outcomes after autologous stem cell transplantation for patients with POEMS syndrome (osteosclerotic myeloma): a single-center experience. *Blood*. 2012;120(1):56-62.
42. Kuwabara S, Hattori T, Shimoe Y, Kamitsukasa I. Long term melphalan-prednisolone chemotherapy for POEMS syndrome. *Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry*. 1997;63(3):385-7.
43. Kuwabara S, Misawa S, Kanai K, Sawai S, Hattori T, Nishimura M, et al. Thalidomide reduces serum VEGF levels and improves peripheral neuropathy in POEMS syndrome. *Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry*. 2008;79(11):1255-7.
44. Khan M, Stone K, van Rhee F. Daratumumab for POEMS Syndrome. *Mayo Clinic proceedings*. 2018;93(4):542-4.
45. Mitsutake A, Matsumoto H, Hatano K, Irie K, Tsukada N, Hashida H. Lenalidomide-Induced Ischemic Cerebrovascular Disease in Polyneuropathy, Organomegaly, Endocrinopathy, Monoclonal Gammopathy, and Skin Changes Syndrome. *Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association*. 2018;27(6):e102-e3.
46. Sayar Z, Weatherill A, Keddie S, Sive J, Lunn MP, Thomas M, et al. High rates of venous and arterial thrombotic events in patients with POEMS syndrome: results from the UCLH (UK) POEMS Registry. *Blood Adv*. 2020;4(10):2139-42.
47. Karam C, Klein CJ, Dispenzieri A, Dyck PJ, Mandrekar J, D'Souza A, et al. Polyneuropathy improvement following autologous stem cell transplantation for POEMS syndrome. *Neurology*. 2015;84(19):1981-7.
48. Thakur S, Dworkin RH, Freeman R, Gorson KC, Herrmann DN. Pain in acquired inflammatory demyelinating polyneuropathies. *Pain*. 2016;157(9):1887-94.
49. Yang H, Zhao H, Gao X, Huang X, Cao X, Zhou D, et al. Endocrine Evaluation in POEMS Syndrome: A Cohort Study. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2020;11:536241.
50. Caimari F, Keddie S, Lunn MP, D'Sa S, Baldeweg SE. Prevalence and course of endocrinopathy in POEMS syndrome. *The Journal of clinical endocrinology and metabolism*. 2018.

5. Metode

Denne retningslinje er udarbejdet af et underudvalg fra DMSG

Litteratursøgning

Foreliggende retningslinje er adapteret fra version 1.0. med opdateret tre-trins søgning.

Der er foretaget tre-trins-søgning med søgning efter eksisterende retningslinjer i GIN, NICE og SIGN. Ingen fundet. Der er fundet en relevant dansksproget retningslinje fra DMSG fra 2013. Der er fundet opdateret anbefalinger på UpToDate (accessed .15.10.2021)

Der er søgt efter systematiske reviews og metaanalyser via Cochrane (2 stk fra hhv 2008 og 2012, intet nyt), Pubmed via Medline, Embase og Cinahl.

Der er supplerende søgt efter primær litteratur via Pubmed via medline fra 2008 af kliniske studier, samt gennemgået referencelister fra primær litteratur.

Litteraturgennemgang

Litteraturen er gennemgået af første forfatteren og retningslinjen af arbejdsgruppen. Der er vægtet systematiske reviews højt, men da populationen er lille er en stor del bygget på case-series og ekspertudsagn. Der er valgt at opsummere resultater fra større case-serier, for at klarlægge evidensen bag ekspertudsagn bedst muligt.

Formulering af anbefalinger

Anbefalinger er efter et rundsendt udkast fra førsteforfatteren vurderet i retningslinjegruppen under DMSG. Da der ikke foreligger systematisk evidens, er anbefalingerne primært baseret på international ekspertkonsensus afpasset nationale forhold ved drøftelse i arbejdsgruppen og DMSG.

Interessentinvolvering

Der har ikke været kontakt til andre DMCG'ere eller patientgrupper, retningslinjen er udarbejdet i samarbejde med neurolog og klinisk biokemiker, da tilgangen er tværfaglig indenfor især diagnostik og rehabilitering.

Høring og godkendelse

Retningslinjen er kommenteret og reviewet af DMSGs bestyrelse og forfattergruppen.

Retningslinjen er godkendt af DMSGs bestyrelse gruppe og forfatterne.

Anbefalinger, der udløser betydelig merudgift

Retningslinjen er ikke forbundet med betydelige merudgifter.

Behov for yderligere forskning

Som nævnt foreligger der ingen randomiserede studier, men udelukkende mindre case serier at basere anbefalinger på. Der er et vedvarende behov for rapportering fra de større kohorter for at klarlægge anbefalinger. Pga sygdommen sjældenhed kan det ikke forventes at der bliver publicerede større randomiserede studier.

Forfattere

- Ida Bruun Kristensen, Hæmatologi, læge, Odense Universitets Hospital
Ingen interessekonflikter
- Anja Klostergaard, Hæmatologi, læge, Århus Universitets Hospital
Ingen interessekonflikter
- Thomas Harbo, Neurologi, læge, Århus Universitets Hospital
Ingen interessekonflikter
- Tina Parkner, Klinisk Biokemi, læge, Århus Universitets Hospital
Ingen interessekonflikter
- Jana Dravecka, Hæmatologi, Rigshospitalet, læge
Ingen interessekonflikter

6. Monitoreringsplan

Standarder og indikatorer

POEMS, herunder resultatet af de udførte diagnostiske undersøgelser, registreres som selvstændig diagnose under den nationale myelomatose kvalitetsdatabase, Da-My-Da.

Plan for audit og feedback

Antallet af diagnosticerede tilfælde rapporteres årligt som led i årsrapporterne fra DMSG. POEMS er en sjælden og ofte overset diagnose. Hvis der over tid viser sig forskel i den regionale forekomst af antallet af diagnosticerede POEMS patienter, vil det danne grundlag for nærmere undersøgelser

7. Bilag

Bilag 1 – Søgestrategi

Søgning efter guidelines

| Databaser (Guidelines) | Dato for søgning | Ansvarlig for søgningen |
|--|------------------|-------------------------|
| G-I-N International http://www.g-in.net/library/international-guidelines-library | 15-OCT-2021 | IBK (0 hits) |
| NICE (UK) https://www.nice.org.uk/guidance/published?type=apg,csg,cg,mpg,ph,sg,sc | 15-OCT-2021 | IBK (0 hits) |
| Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) http://www.sign.ac.uk/our-guidelines.html | 15-OCT-2021 | IBK (0 hits) |
| National Guideline Clearinghouse: https://www.guideline.gov | 15-OCT-2021 | IBK (0 hits) |

Søgning efter systematiske reviews (POEMS syndrome)

| Databaser (systematiske reviews) | Dato for søgning | Ansvarlig for søgningen |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| Medline | 15-OCT-2021 | IBK (1 hits) |
| EMBASE | 15-OCT-2021 | IBK (19 hits) |
| CINAHL | 15-OCT-2021 | IBK (1 hit) |
| Cochrane | 15-OCT-2021 | IBK (1 hit) |
| | | |

Søgning efter primærlitteratur (fx randomiserede kontrollerede forsøg) (POEMS syndrome)

| Databaser (primær litteratur) | Dato for søgning (dd/mm/åååå) | Ansvarlig for søgningen (navn(e)) |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Medline | (24/09/2018) | IBK |

Søgestrategier (kopieret ind) 15.10.2021

Systematisk reviews:

Medline via PubMed (1 hits) 15-OCT-2021

| Search | Add to builder | Query | Items found |
|--------|----------------|---|-------------|
| #1 | Add | Search (POEMS syndrome) Filters: Humans, systematic review, English, from 01/SEPT/2018 | 1 |

Embase (19 hits) 15-OCT-2021

| Search | Add to builder | Query | Items found |
|--------|----------------|---|-------------|
| #1 | Add | Search (POEMS syndrome) Filters: Humans, review, English, from 01-JAN-2021 | 19 |

Cinahl (1 hits) 15-OCT-2021

| Search | Add to builder | Query | Items found |
|--------|----------------|---|-------------|
| #1 | Add | Search (POEMS syndrome) Filters: Humans, systematic review, English, from 01/AUG8/2018 | 1 |

Primær litteratur:

Medline via PubMed (hits) 03.sept.2021

| Search | Add to builder | Query | Items found |
|--------|----------------|--|-------------|
| #1 | Add | Search (POEMS syndrome) Filters: Humans, , English, from 01/01/2019 | 66 |

Alle titler gennemgået, herefter gennemgået abstracts for udvælgelse af relevant litteratur.

Medline via PubMed 15.oct.2021

| Search | Add to builder | Query | Items found |
|--------|----------------|---|-------------|
| #1 | | Search (POEMS syndrome) Filters: Humans, English, clinical trial, from 01-sep-2018 | 5 |

Abstracts og titler systematisk gennemgået for relevans. 1 ikke relevant, resten fundet ved primær søgning.

Om denne kliniske retningslinje

Denne kliniske retningslinje er udarbejdet i et samarbejde mellem Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Indsatsen med retningslinjer er forstærket i forbindelse med Kræftplan IV og har til formål at understøtte en evidensbaseret kræftindsats af høj og ensartet kvalitet i Danmark. Det faglige indhold er udformet og godkendt af den for sygdommen relevante DMCG. Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet har foretaget en administrativ godkendelse af indholdet. Yderligere information om kliniske retningslinjer på kræftområdet kan findes på:

www.dmcg.dk/kliniske-retningslinjer

Retningslinjen er målrettet klinisk arbejdende sundhedsprofessionelle i det danske sundhedsvæsen og indeholder systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges som beslutningsstøtte af fagpersoner og patienter, når de skal træffe beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer.

De kliniske retningslinjer på kræftområdet har karakter af faglig rådgivning. Retningslinjerne er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.

Retningslinjen indeholder, udover de centrale anbefalinger (kapitel 1), en beskrivelse af grundlaget for anbefalingerne – herunder den tilgrundliggende evidens (kapitel 3+4). Anbefalinger mærket A er stærkest, Anbefalinger mærket D er svagest. Yderligere information om styrke- og evidensvurderingen, der er udarbejdet efter "Oxford Centre for Evidence-Based Medicine Levels of Evidence and Grades of Recommendations", findes her: http://www.dmcg.dk/siteassets/kliniske-retningslinjer--skabeloner-og-vejledninger/oxford-levels-of-evidence-2009_dansk.pdf

Generelle oplysninger om bl.a. patientpopulationen (kapitel 2) og retningslinjens tilblivelse (kapitel 5) er også beskrevet i retningslinjen. Se indholdsfortegnelsen for sidehenvielse til de ønskede kapitler.

For information om Sundhedsstyrelsens kræftpakker – beskrivelse af hele standardpatientforløbet med angivelse af krav til tidspunkter og indhold – se for det relevante sygdomsområde:

<https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kraeft/pakkeforloeb/beskrivelser>

Denne retningslinje er udarbejdet med økonomisk støtte fra Sundhedsstyrelsen (Kræftplan IV) og RKKP.